

Centro di Controllo Micologico dell'ASL BI

Come succede da diversi anni, le analisi effettuate nell'ambito del piano di monitoraggio nazionale della radioattività ambientale dal laboratorio Arpa di Ivrea su un campione di funghi appartenenti alla specie "**Xerocomus badius** (Fr.) E.J. Gilb.", prelevati presso il territorio di questa ASL, sono stati rilevati livelli significativi di radioattività, dovuta ancora all'incidente nucleare di Chernobyl

Per quanto sopra e sulla base di quanto riportato nella nota Arpa, considerato anche che tale specie ha presentato la stesse problematiche su campioni effettuati in altre zone del Piemonte si ritiene ancora necessario **sconsigliare il consumo dei funghi appartenenti alla specie "Xerocomus badius" (nome comune boleto baio o frè).** Inoltre a titolo precauzionale si estende tale misura anche ai funghi appartenenti alla specie "**Rozites caperatus**" (nome comune foliota grinzosa), altra specie notoriamente ipercaptante.

Si precisa altresì che tale misura precauzionale non deve essere estesa automaticamente ai funghi appartenenti ad altre specie in quanto la maggior parte, tra cui ad esempio il ben noto *Boletus edulis* (porcino), presentano normalmente concentrazioni di radioisotopi molto inferiori anche quando condividono il medesimo ambiente dei funghi segnalati

Xerocomus badius (Fr.) E.J. Gilb. = **Boletus badius** Fr.:Fr. = **Imleria badia** (Fr.) Vizzini 2014

Cappello: carnoso, cuticola vellutata, asciutta, diventa viscida con l'umido, di colore marroncino, bruno-rossastro. Tubuli: in evidenza i pori che virano rapidamente al blu se toccati, prima biancastri, poi subito giallo-verdastri, virano al blu al taglio. Pori: tondi, giallo pallido, viranti al blu se compressi. Gambo: cilindrico, attenuato alla base di colore giallo sporco oppure nocciola, più chiaro all'apice.

Rozites caperatus (Pers.) P. Karst.
= **Cortinarius caperatus** (Pers.):Fr.

Cappello: dal giallo-crema al giallo-paglierino; superficie pileica con un fitta pruina biancastra che tende a sfaldarsi a maturità, creando delle caratteristiche rugosità. Lamelle: adnate che tendono a virare con la maturità da un giallo pallido ad ocraceo. Gambo: piuttosto tozzo ricoperto da residui del velo fioccosi. Presenta un anello. Carne: immutabile al taglio, debole odore fungino. Sapore grato.



Descrizione ed iconografia delle due specie

