

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Don Luigi Sturzo n. 20 – 13900 BIELLA
Direttore: Dr. Damiano Mones
Tel. 015-1515 9255 Fax. 015-15159222
dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it
PEC: suap@cert.aslbi.piemonte.it

EFFETTI COLLATERALI DELLE VACCINAZIONI

Gli effetti collaterali provocati dalle vaccinazioni sono in genere lievi e si presentano solo in una minoranza dei vaccinati.

Tuttavia le reazioni più frequenti vanno conosciute dai genitori per evitare inutili allarmismi. A tal proposito si forniscono i seguenti suggerimenti.

Che cosa fare dopo

Dopo la vaccinazione il bimbo può manifestare, anche se raramente, qualche transitorio comportamento insolito. Di seguito riportiamo le risposte alle domande più frequenti; se avete altri dubbi o desiderate altre informazioni chiamate il pediatra di base o il servizio vaccinazioni.

Dopo la vaccinazione il mio bambino è irrequieto, che cosa devo fare?

Dopo la vaccinazione i bambini possono apparire particolarmente irrequieti a causa del dolore nella sede dell'iniezione. Si può somministrare loro un farmaco, il "paracetamolo", che aiuta a ridurre il dolore; tale sostanza si trova in commercio con il nome di Tachipirina, Efferalgan, ecc.

Ai bambini **non** deve essere somministrata aspirina perché questo farmaco nel bambino può determinare la comparsa, in qualche caso, di effetti collaterali importanti.

Se lo stato di irrequietezza persiste per più di 24 ore, consultate il pediatra di famiglia o il servizio vaccinale.

La zona in cui il vaccino è stato iniettato è calda, gonfia e arrossata. Che cosa devo fare?

Per alleviare il fastidio è sufficiente applicare sulla zona gonfia o arrossata un panno pulito e inumidito con acqua fredda oppure la borsa del ghiaccio. Se ritenete che il bambino abbia molto dolore poiché reagisce alla minima pressione sulla zona gonfia e arrossata, potete somministrare il paracetamolo (vedi oltre).

Se dopo 24 ore il rossore tende ancora ad aumentare, chiamate il pediatra di famiglia o il servizio vaccinale.

Se il bambino ha la febbre:

- mantenete la calma e ricordate che la febbre è una normale risposta dell'organismo alla somministrazione del vaccino;

- vestitelo in modo leggero: coprire eccessivamente un bambino con la febbre può far salire ulteriormente la temperatura e contribuire ad aggravare il disagio;

- il bambino di solito tollera bene la febbre fino a 39°C (ascellare) o 39,5° C (rettale). Tuttavia, anche se la febbre non è elevata ma il bambino è irritabile, molto lamentoso oppure piange a causa del dolore nella sede dell'iniezione, potete somministrare ugualmente il paracetamolo, che possiede anche un'azione analgesica (azione contro il dolore).

Se la febbre persiste o tende ad aumentare, consultate il pediatra di fiducia.

DOSE DI PARACETAMOLO: la dose deve essere calcolata in base al peso del bambino ed è la stessa sia per la febbre sia per l'irritabilità. Nelle tabelle che seguono sono riportate le dosi di Tachipirina. Il paracetamolo è disponibile anche con altri nomi commerciali (per es. Efferalgan ecc.): in questi ultimi il dosaggio è differente (in tal caso controllate il foglietto illustrativo).

TACHIPIRINA GOCCE

Peso	Età (approssimata)	Dose singola	Dose giornaliera
da 3,2 kg	0-30 giorni	8 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
da 4,3 kg	1 mese	10 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
da 5,3 kg	2 mesi	13 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
da 6,1 kg	3 mesi	22 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
da 6,7 kg	4 mesi	25 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
da 7,2 kg	5-6 mesi	27 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
da 8 kg	7-10 mesi	30 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
da 9 kg	11-14 mesi	33 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
da 10 kg	15-19 mesi	36 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
da 11 kg	20-23 mesi	39 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)

Qualora il neonato presenti particolari problemi di salute preghiamo di darne comunicazione al personale medico prima della seduta vaccinale, esibendo l'eventuale documentazione sanitaria in possesso dei genitori (in particolare lettere di dimissioni ospedaliere).

Per ulteriori informazioni sui vaccini segnaliamo, tra gli altri, i seguenti indirizzi internet:

<http://www.seremi.it/content/vaccinazioni-pediateriche-le-domande-difficili>

<http://www.vaccinarsi.org>

<http://www.epicentro.iss.it>

<http://www.genitoripiu.it>

Grazie per l'attenzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO