

Nati nel 2017

3° mese

1° dose: **difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV), Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

1° dose: **pneumococco** (vaccino contro la meningite da pneumococco; non obbligatorio)

dopo circa 15 giorni

3° mese

1° dose: **meningococco B** (vaccino contro la meningite di tipo B; non obbligatorio)

5° mese

2° dose: **difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV), Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

2° dose: **pneumococco** (vaccino contro la meningite da pneumococco; non obbligatorio)

dopo circa 15 giorni

5° mese

2° dose: **meningococco B** (vaccino contro la meningite di tipo B; non obbligatorio)

7° mese

3° dose: **meningococco B** (vaccino contro la meningite di tipo B; non obbligatorio)

11° mese

3° dose: **difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV), Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

3° dose: **pneumococco** (vaccino contro la meningite da pneumococco; non obbligatorio)

13°-15° mese

1° dose: **morbillo, parotite, rosolia, varicella** (vaccino tetravalente)

meningococco C (vaccino contro la meningite di tipo C; non obbligatorio)

15°-18° mese

4° dose: **meningococco B** (vaccino contro la meningite di tipo B; non obbligatorio)

Le vaccinazioni contro **pneumococco, meningococco B e meningococco C** ai fini del nuovo Decreto sull'obbligo vaccinale, non sono obbligatorie ma fortemente raccomandate