

Struttura Complessa **LABORATORIO ANALISI**

Direttore f.f. Dr. Aurelio Malabaila


Tel. 015-15154924 Fax. 015-15154907

aurelio.malabaila@aslbi.piemonte.it

SCOTCH TEST (TEST DI GRAHAM)

L'esame si effettua al mattino possibilmente molto presto, prima di lavarsi e defecare, per catturare le uova facendole aderire alla superficie gommosa dello scotch. Infatti gli ossiuri migrano di notte sino all'apertura anale dove depongono le uova. Pertanto, non applicare creme o borotalco in zona perianale la sera precedente.

Materiale fornito dal laboratorio: 2 vetrini, portavetrini e una provetta.



PREPARAZIONE

Appoggiare dello **scotch trasparente** (non usare scotch opaco) alla provetta fornita tenendo la parte adesiva dello scotch verso l'esterno (figura 1)


Figura 1



ESECUZIONE TEST

Separare le natiche del paziente con una mano e fare aderire la parte adesiva attorno all'ano, in più punti per alcune volte (figura 2)

Figura 2



ALLESTIMENTO VETRINO

Distendere accuratamente lo scotch sul vetrino (figura 3) evitando il più possibile di fare bolle. Strofinare delicatamente la superficie del nastro adesivo utilizzando un batuffolo di cotone per farlo aderire bene al vetrino. Porre il vetrino nel portavetrini fornito. e lavarsi accuratamente le mani in quanto le uova di ossiuri sono infettanti.

Figura 3

Consegnare il materiale presso il Centro Prelievi dalle ore 7.00 alle 9.30